



HOME DEFENSE

MAX®

INSECT KILLER GRANULES

GRANULOS INSECTICIDAS



KEEPS BUGS OUT FOR ^{Up To} **3-MONTHS!** GUARANTEED†

OUTDOOR GRANULES

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCION Consulte el panel posterior para conocer los avisos de precaucion adicionales.

Active Ingredient:	
Bifenthrin	0.115%
Other Ingredients:	99.885%
Total	100.000%

Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum
For residential home perimeter use only
May contain peanut by-products

NET WT/PESO NETO
2.5 lb (1.14kg)





HOME DEFENSE

MAX[®]

INSECT KILLER GRANULES

- Keeps bugs out for up to 3 months!
- Treats the average 2,000 sq ft 2-story home over 2 times!



PEOPLE AND PETS may re-enter after it is watered in and allowed to dry

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Water treated area as directed on this label. Do not water to the point of run-off. Do not make applications during rain. In New York State, this product may NOT be applied to any grass or turf area (lawns) within 100 feet of a water body (lake, pond, river, stream, wetland, drainage ditch). In New York State, do make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after the first application.

PRODUCT FACTS

Insects controlled

Use Ortho[®] Home Defense MAX[®] Insect Killer Granules to kill and control: Fleas

Use Ortho[®] Home Defense MAX[®] Insect Killer Granules to kill and provide season long (3-month) control of: Fire Ants, Ants (including Carpenter Ant, Red Harvester Ant, Pavement Ant, Odorous Ant, Pyramid Ant, Argentine Ant, Pharaoh Ant, Black Turf Ant, White-footed Ant, Crazy Ant, Little Black Ant, Small Honey Ant, Lawn Ant, Cornfield Ant, Ghost Ant, Thief Ant, Acrobat Ant, Citronella Ant, Big-headed Ant, Allegheny Mound Ant), American Dog Ticks, Armyworms (including Lawn Armyworm, Fall Armyworm), Billbugs (including Bluegrass Billbug, Hunting Billbug), Black Turfgrass Ataenius adults, Bristletail, Centipedes, Chiggers, Chinch Bugs, Crickets (including House Cricket, Common Short-tailed Cricket, Indies Short-tailed Cricket, Arizona Cricket, Tropical Cricket, Variable Field Cricket, Fall Field Cricket, Southeastern Field Cricket, Texas Field Cricket, Spring Field Cricket, Northern Wood Cricket, Western Striped Cricket, Eastern Striped Cricket, Sand Field Cricket, Vocal Field Cricket, Southern Wood Cricket),

(continued on base)

ORTHO[®] & YOUR ENVIRONMENT: Your home and yard are places for family and pets to enjoy. That's why Ortho[®] products are designed with care to provide effective solutions to insect problems inside and outside your home. For best results and a healthy environment, please follow instructions for appropriate usage, storage and disposal.

OPEN
Resealable
Label for
Directions
& Precautions
Para español,
ver página 1



Questions, Comments or Medical Information
Preguntas, comentarios o información médica
1-800-225-2883 www.ortho.com

©2014 The ORTHO Group. World rights reserved.
Sold by The ORTHO Group, PO Box 190, Marysville, OH 43040
EPA Reg. No. 279-3240-239
EPA Est. No. 538-OH-2V, 538-SG-1P,
9198-OH-20, 9198-OH-1M,
9198-AI-1I, 85652-OH-1W
Superscript is first letter of lot number



LB5511

FPO

0 71549 01960 0
1030

Insectos controlados

Use los gránulos insecticidas Ortho® Home Defense MAX® para matar y controlar: Pulgas
Use los gránulos insecticidas Ortho® Home Defense MAX® para matar y brindar control durante toda la temporada (3 meses) contra: Hormigas de fuego, hormigas (inclusive la hormiga carpintera, la hormiga roja recolectora, la hormiga del pavimento, la hormiga olorosa, la hormiga pirámide, la hormiga argentina, la hormiga faraona, la hormiga escarabajo negra, la hormiga de patas blancas, la hormiga loca, la pequeña hormiga negra, la pequeña hormiga de la miel, la hormiga de jardín, la hormiga del maíz, la hormiga fantasma, la hormiga ladrona, la hormiga acrobata, la hormiga de la citroneta, la hormiga leona y la hormiga constructora de montículos de Allegheny), garrapatas americanas de perro, gusanos cogedores (incluido el gusano cogedor del césped y el gusano cogedor del maíz), curculiónidos (incluido el curculiónido de pasto azul y el curculiónido cazador), escarabajos negros del césped del género Ateneus, lepismas, ciempiés, chigoes, chinches, grillos (incluido el grillo doméstico, el grillo común de cola corta, el grillo de las Indias de cola corta, el grillo de Arizona, el grillo tropical, el grillo de campos variables, el grillo de campos de otoño, el grillo de los campos del Sudeste, el grillo de los campos de Texas, el grillo de los campos de primavera, el grillo de los bosques del Norte, el grillo rayado del Oeste, el grillo rayado del Este, el grillo de los campos de arena, el grillo vocal del campo y el grillo de los campos del Sur), gusanos cortadores (incluido el gusano cortador negro, el gusano de bronce, el gusano granulado y el gusano variegado), escarabajo pulgaj de la oreja de ratón, tijeretas, larvas de tipula europea, saltarín leonado, insectos de fuego, moscas frit, saltamontes, añidos verdes, escarabajos de tierra, mariquitas (incluida la mariquita convergente, la mariquita de siete manchas, la mariquita de dos manchas, la mariquita de trece manchas, la mariquita con dos puntaladas, la mariquita asiática y la mariquita cochinita), saltahojas, polillas de Lucerna, cochinitas harinosas, miriápodos, grillos topo (incluido el grillo topo leonado, el grillo topo del Sur y el grillo topo de alas cortas), insecto bolita, escorpiones (incluido el escorpión de cola rayada de Arizona, el escorpión del Sur, el escorpión de cola rayada pequeño, el escorpión amarillo, el escorpión común de California, el escorpión del Norte y el escorpión de arena del Este), gusanos de las semillas, cochinitas, arañas (incluida la araña marmolada de sótano, la araña grande de sótano, la araña pequeña de sótano, la araña lobo de patas finas, la araña lobo excavadora, la araña lobo pirata), colémbolos, gusanos rayados del césped, garrapatas (incluidas las garrapatas café de perro y las garrapatas que pueden transmitir la enfermedad de Lyme), chinches chupadoras de savia de dos líneas, gusanos telarañeros (incluido el gusano peludo, el gusano peludo del césped y el gusano peludo tropical), gorgojos (incluido el Hiperodes y el de pasto azul) y gusanos alambre.

INSTRUCCIONES

Es una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta. Riegue el área de tratamiento según se indica en esta etiqueta. No sobreniegue hasta el punto que el agua se oscurece. No haga aplicaciones cuando está lloviendo.

En el estado de Nueva York este producto NO puede ser aplicado en ninguna área de grama o tepe (césped) en un radio de 30 metros de un cuerpo de agua (lago, estanque, río, arroyo, ciénaga, zanja de drenaje). En el estado de Nueva York, repita una sola vez la aplicación de este producto si hay señales de actividad renovada de insectos, pero no antes de dos semanas después de la primera aplicación.

DÓNDE APLICAR: Alrededor de los cimientos de la casa (tratamiento perimetral).

CUÁNDO APLICAR: Aplicar a la primera oportunidad para prevenir la infestación. De lo contrario, aplique al primer indicio de actividad o daño de insectos.

CÓMO APLICAR: Cimientos de la casa: Aplique uniformemente sobre una franja de 0.61 metros cerca de los cimientos de la casa. Use entre 227 y 454 gramos de producto por cada 46 metros cuadrados (0.60 metros x 76.2 metros). Para un control que dure toda la temporada (3 meses), aplicar 1.13 kg de producto por cada 58 metros cuadrados. Si fuera necesario, vuelva a aplicar después de 3 meses. Para obtener mejores resultados, el área tratada debe ser regada a fondo inmediatamente después de la aplicación.

Los utensilios para comida tales como cucharas y cucharitas no se deben utilizar para alimentos después de haberlos utilizado para medir pesticidas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Prohibiciones: Al almacenarlo o eliminarlo no contamine el agua, la comida ni los alimentos para animales.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales. Guarde solo en los envases originales. Guarde en un lugar fresco y seco, y evite el calor excesivo. Abra el recipiente con cuidado. Para envases rígidos, luego del uso parcial del producto, vuelva a colocar la tapa y cierre con firmeza.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA: Si está vacío: Envase no rellenable. No vuelva a usar o rellenar este envase. Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCION

Riesgos para humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN: Es dañino si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con ojos, piel o ropa. Lave con abundante agua y jabón después de usarlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o consumir tabaco. Debe quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

Si cae en la piel o ropa: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o al doctor para obtener más recomendaciones de tratamiento.

Número de emergencias: Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamientos o al doctor, o al buscar tratamiento. También puede comunicarse al 1-800-225-2883 para obtener ayuda de emergencia.

Nota para el médico: Este producto es un piretroides. Si ha ingerido grandes cantidades debe evitarse tomar leche, crema o cualquier otra grasa o aceite digerible, pues puede aumentar la absorción del pesticida.

RIESGOS AMBIENTALES: Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, evite que el pesticida ingrese o se oscurece por desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canaletas o aguas superficiales. Aplique este producto en condiciones climáticas estables cuando no se pronostiquen lluvias para las siguientes 24 horas, para asegurarse de que el viento o la lluvia no vuelen o laven el pesticida del área tratada. Barra el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la acera o la calle hacia el área tratada del césped o jardín para evitar que se oscurece a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

AVISO: En la medida permitida por la ley aplicable, el comprador asume todos los riesgos de seguridad y uso de este producto si no se siguen las instrucciones.

LA GARANTÍA ORTHO®: Si por cualquier razón usted no está satisfecho con este producto, envíenos por correo el comprobante de venta para recibir un reembolso total del precio de compra.

(continued from book front)

Cutworms (including Black Cutworm, Bronzed Cutworm, Granulate Cutworm, Variegated Cutworm), Dichondra Flea Beetle, Earwigs, European Crane Fly Larvae, Fiery Skipper, Firebrat, Frit Fly, Grasshoppers, Greenbug, Ground Beetle, Ladybeetles (including Convergent Ladybeetle, Seven-spotted Ladybeetle, Two-spotted Ladybeetle, Thirteen-spotted Ladybeetle, Twice-stabbed Ladybeetle, Asian Ladybeetle, Mealybug Ladybird), Leafhoppers, Lucerne Moth, Mealybugs, Millipedes, Mole Crickets (including Tawny Mole Cricket, Southern Mole Cricket, Short-Winged Mole Cricket), Pillbugs, Scorpions (including Arizona Stripetail Scorpion, Southern Unstriped Scorpion, Lesser Stripetail Scorpion, Yellow Ground Scorpion, California Common Scorpion, Northern Scorpion, Eastern Sand Scorpion), Seed Maggots, Sowbugs, Spiders (including Marbled Cellar Spider, Longbodied Cellar Spider, Shortbodied Cellar Spider, Thinlegged Wolf Spider, Burrowing Wolf Spider, Pirate Wolf Spider), Springtails, Striped Grassworm, Ticks (including Brown Dog Tick and ticks that may transmit Lyme Disease), Two-lined Spittle Bugs, Webworms (including Sod Webworm, Grass Webworm, Tropical Sod Webworm), Weevils (including Hyperodes and Bluegrass) and Wireworms.

WHERE TO APPLY: Around Home Foundations (Perimeter Treatment)
WHEN TO APPLY: Apply early to prevent infestation. Otherwise, apply at the first sign of insect activity or damage.
HOW TO APPLY: Home Foundation: <ul style="list-style-type: none"> • Evenly apply a 2 foot wide band next to the home foundation. • Use 0.5 to 1.0 lb for each 500 sq ft (2 ft x 250 ft). • For Season Long (3 months) control, apply 2.5 pounds of product over 625 sq ft. • Re-apply after 3 months if necessary. • For best results, treated area should be thoroughly watered immediately after application.

Food utensils such as tablespoons/teaspoons must not be used for food purposes after use in measuring pesticides.

STORAGE AND DISPOSAL

Prohibitions: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep out of reach of children and animals. Store in original containers only. Store in a cool, dry place to avoid excess heat. Carefully open containers. For rigid containers after partial use replace lids and close tightly.

PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL: **If empty:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if absorbed through the skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOTLINE NUMBER: Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-225-2883 for emergency assistance.

NOTE TO PHYSICIAN: This product is a pyrethroid. If large amounts have been ingested, milk, cream or other digestible fats and oils may increase absorption and so should be avoided.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

THE ORTHO® GUARANTEE

If for any reason you, the consumer, are not satisfied with this product, mail us your original proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.

©2014 The ORTHO Group.
World rights reserved.
Sold by **The ORTHO Group**
P.O. Box 190, Marysville, OH 43040



Questions, Comments or Medical Information
Preguntas, comentarios o información médica
1-800-225-2883 www.ortho.com

EPA Reg. No. 279-3240-239
EPA Est. 538-OH-2V, 538-SC-1P, 9198-OH-2O,
9198-OH-1M, 9198-AL-1L, 85652-OH-1W
Superscript is first letter of lot number.

LB5511